

Madex Twin

درجة السمية : WHO IV

قابلية المزج: قابل للمزج مع معظم البييدات الزراعية (5-8,5 PH)

التأثير على البيئة: لا يوجد أي تأثير سلبي على النحل، الطيور والأحياء البحرية والثدييات

التخزين: يحفظ في مكان جاف وبارد في عبوته الأصلية بعيداً عن مصادر الحرارة والطعام والعلف ومتناول الأطفال. سنتين على درجة حرارة 5 درجات C وإلى تخزين طويل الأمد -18 درجة C التخلص من العبوات الفارغة: يجب غسل العبوات الفارغة ثلاث مرات وإرجاع المحلول إلى خزان الرش وبعدها تنقّب العبوات وتحفظ في مكان آمن بعيداً عن مجاري المياه.

المسؤولية القانونية: إن المنتج والموزع يضمنان جودة المادة ولا يتحملان أي مسؤولية قد تنتج عن سوء الإستعمال بما أن ليس لهما أي إشراف على استعمال أو التخزين هذا المبيد.

مبيد حشري بيولوجي لمكافحة عثة أو فراشة الفاكهة
المادة الفعالة:

جزيئات الفيروس Granulovirus

> 3 x 10¹³ GV/Liter

(Cydia Pomonella Granulovirus)

مركز معلق (SC)

المحاصيل	الأفة	نسبة الإستعمال	فترة الأمان
التفاح - الإجاص الخوخ - الدراق الجوز - اللوز الكستناء - السفرجل	عث الفاكهة وكربوكيسة الشرقية	10 مل / 100 لتر ما يعادل 100 مل / هكتار	7 أيام

الإسعافات الأولية:

إبعاد المصاب عن مصدر التعرض للمبيد واسدعاء الطبيب فوراً:

- في حال إستنشاق المبيد: نقل المريض إلى الهواء الطلق
- في حال ابتلاع المبيد: إعطار المصاب كوبين من الماء وإجباره على التقيؤ

- لا تجبر المصاب على التقيؤ إذا كان فاقداً للوعي
- في حال ملامسة المبيد للجلد أو الثياب: نزع الملابس الملوثة بالمبيد وغسل البشرة بالماء.

- في حال ملامسة العيون: غسلها جيداً بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل

رقم الدفعة:

السعة:

تاريخ الانتاج:

الوزن:

تاريخ انتهاء الصلاحية:

الوزن الصافي:

مبيد حشري بيولوجي يحتوي على جزيئات للفيروس لمكافحة عث أو فراشة التفاحات وكربوكيسة الشرقية ويعمل عبر الجهاز الهضمي.

إن توقيت المعاملة في المراحل الأولى عند وضع البيض أو التي تكون على الأوراق أو على سطح الثمار وقبل دخول اليرقات إلى داخل الثمار يجعل التطبيق أكثر فاعلية. يتحلل Madex twin تحت أشعة الشمس لذلك يفضل رش كل جيل من 3 إلى 4 مرات كل 6-8 أيام مشمسة فترة الإنتظار قبل دخول إلى الحقل 4 ساعات للمراقبة: يفضل استعمال المصائد لرصد الأفة

توصيات عامة:

ضغط PSI 40.

رذاذ حجم القطرة : 200-400 ميكرون

لا نس مفتوح

معدل رش للهكتار حوالي 1000 لتر وقد يزيد أو ينقص حسب حجم الأوراق

الإستعمال الصحيح للمبيد: يضاف المحلول إلى الماء ويحرك جيداً ومن ثم يضاف إلى خزان الرش حيث يخلط مجدداً، يفضل رشه عند مغيب الشمس.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

الإستعمال الصحيح للمبيد : يضاف الكمية المحدودة من المحلول إلى 200 - 1600 لتر / هكتار

من الماء (حسب حجم الأوراق) ثم يحرك المحلول جيداً ومن ثم يضاف إلى خزان الرش حيث يخلط مجدداً يفضل رشه عند مغيب الشمس

إحتياطات السلامة: يجب أخذ الإحتياطات اللازمة عند رش المبيد مثل:

ارتداء الملابس والأحذية والنظارات الواقية وكفوف وغسل اليدين بعد عملية الرش

عدم التدخين والأكل أثناء الرش، عدم تنشق أو ابتلاع المبيد أو رذاذ الرش وتجنب ملامسة المبيد عند هبوب الريح

الشركة الموزعة: EVIX PLUS S.A.R.L.

Lebanon - Beirut:

Ramlet El Bayda, Bank Lebanon and Gulf.4th floor

Telfax: 00961-1-792024

Mob: 00961-71-384684

evixplus@evixgroup.com

www.evixgroup.com

الشركة المصنعة:

Andermatt Biocontrol
Switzerland



Harmful

ضار

